

Laceration Care After Suturing or Gluing

תפירה והדבקה חתכים

בעקבות פציעה יש לעיתים צורך בהדבקה או תפירה של פצע המאפשרת ריפוי מלא. הדבקה או תפירה נעשית על פי שיקול דעת הרופא, ההדבקה או התפירה נעשית לאחר ניקוי וחיטוי יסודי.

מס' כללים שיסייעו בריפוי מלא של הפצע:

- ❖ במקרה של הדבקה לשמור על הפצע נקי ויבש מס' שעות – אין לכסות את הפצע.
- ❖ אין צורך לכסות אזור לאחר ההדבקה.
- ❖ אין להרטיב את הפצע שנתפר במשל 48 שעות הראשונות אזור תפרים ניתן לשטוף בעדינות במים וסבון-לא לשפשף את המקום.
- ❖ לא להיכנס לבריכה או ים למשך 5 ימים.

ב-24 שעות ראשונות לאחר תפירה או הדבקה

- ❖ ניתן לקחת תרופות נגד כאבים (לפי הוראות הרופא).
- ❖ במידה והתפרים הם באזור המרפק, או הברך להימנע מתנועות באזור.

הוראות נוספות:

- ▮ טיפול אנטיביוטי על פי הוראת רופא.
- ❖ הוצאת תפרים בקהילה ע"פ הוראות הרופא.

במידה ויופיעו הסימנים הבאים לפנות מיד לרופא:

- ✓ דימום מאזור פצע או הדבקה.
- ✓ עלית חום גבוה מעל 38 מעלות.
- ✓ נפיחות ואודם באזור התפר.
- ▮ הפרשה מאזור התפרים.